

Instructions for Use**Български** / Bulgarian (BG)**Hrvatski** / Croatian (HR)**Česky** / Czech (CS)**Dansk** / Danish (DA)**English-UK** / English-UK (GB)**Eesti** / Estonian (ET)**Français** / French (FR)**Deutsch** / German (DE)**Ελληνικά** / Greek (EL)**Magyar** / Hungarian (HU)**Italiano** / Italian (IT)**Lietuviškai** / Lithuanian (LT)**Македонски** / Macedonian (MK)**Norsk** / Norwegian (NO)**Polski** / Polish (PL)**Português** / Portuguese (PT)**Română** / Romanian (RO)**Slovensky** / Slovak (SK)**Español** / Spanish (ES)**Svenska** / Swedish (SV)

Обобщение на EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control	
Каталожен номер	COV000CE
Реактивен анализ	DНК на човешки геном
Нереактивен анализ	SARS-CoV-2
Матрица	Синтетична матрица
Консервант	Натриев азид
Съхранение	-20°C или по-малко
Обем на запълване	0,3 ml
Брой флакони в комплект	5 флакона
Брой употреби	Еднократна употреба
Срок на годност	12 месеца от датата на производство
Предпазни мерки	Биологични рискове
Регулаторен статус	За използване при инвитро диагностика

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control е външен контрол на качеството, пред назначен за употреба с анализи SARS-CoV-2 за мониториране на ефективността на дадения анализ. Контролът е предназначен за мониториране на липсата на SARS-CoV-2. Рутинната употреба на EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control позволява на лабораториите да оценяват вариациите в рамките на деня и вариациите между партидите на техните молекулярен анализ за добра операторска практика.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control съдържа ДНК на човешки геном и е отрицателен за SARS-CoV-2. Контролът е пред назначен за тестване на целия процес на молекулярен анализ, в това число екстракция, амплификация и детекция.

На EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control е вътрешно назначена стойност чрез Bio-Rad Digital Droplet PCR (ddPCR). EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control е формулиран в синтетична матрица, която съдържа консерванти.

ПРОЦЕДУРА:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control изисква стъпка на екстракция. Контролът трябва да се третира по начин, подобен на другите тествани пробы. Това позволява на оператора да оцени своята техника на екстракция.

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control е неанализиран контрол и няма назначени стойности. Контролът не е заместител на контролите в комплекта на производителя, предоставени с анализа. EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control трябва да се тества според инструкциите и препоръките на производителя на анализа или тестващата лаборатория. Очакваните резултати от използването на EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control трябва да бъдат установени от крайния потребител за конкретния анализ.

СЪХРАНЕНИЕ И БОРАВЕНЕ:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control трябва да се съхранява при температура -20°C или по-малко.

Размразете EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control на стайна температура и поставете за кратко във вортекс преди употреба.

След размразяване EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control е стабилен в продължение на 24 часа, когато се съхранява при температура 2 – 8°C. Останалите материали трябва да бъдат изхвърлени след една употреба. Не използвайте повторно. Не разреждайте.

Не използвайте EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control след изтичане на срока на годност.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

За използване при инвитро диагностика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control трябва да се счита за биологично опасен. Трябва да се прилагат универсални предпазни мерки и правилно изхвърляне¹. Не пипетирайте с уста. Не пушете, яжте или пийте в зони, където се борави с прости.

Изхвърлете продукта, ако опаковката е нарушена или тече. Дезинфекцирайте течности, материали или разливи с 0,5% разтвор на натриев хипохлорит. Изхвърлете всички материали и течности, използвани в процедурата, все едно съдържат патогенни агенти.

БИБЛИОГРАФИЯ:

- ¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec, 35 (10 Suppl 2): S65-164.
BIO-RAD и DROPLET DIGITAL PCR са търговски марки на Bio-Rad Laboratories, Inc. в определени юрисдикции.

СПРАВКА ЗА СИМВОЛИТЕ:

Каталожен номер



Партиден номер



За използване при инвивто диагностика



Биологични рискове



Срок на годност



Горна граница на температурата



Производител



Внимание



Прочетете инструкциите за употреба




Отрицателен контрол



Европейски знак за съответствие



Упълномощен представител



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
United States

Производител: Exact Diagnostics LLC, 3400 Camp Bowie Blvd. CBH-214, Fort Worth, Texas 76107
За съдействие и поръчки изпратете имейл до customerservice@exactdiagnostics.com или се обадете на телефон

817 989 9262www.exactdiagnostics.com

PI0106-ROW Rev. 01.00

Sažetak kontrole EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control	
Kataloški broj	COV000CE
Reaktivni analit	DNK humanog genoma
Nereaktivni analit	SARS-CoV-2
Matriks	Sintetički matriks
Konzervans	Natrijev azid
Čuvanje	-20 °C ili niže
Volumen punjenja	0,3 ml
Broj boćica po kompletu	5 boćica
Broj uporaba	Jednokratna uporaba
Rok trajanja	12 mjeseci od datuma proizvodnje
Mjere opreza	Biološki rizici
Regulatorni status	Za in vitro dijagnostičku primjenu

NAMIJENJENA UPORABA:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control je eksterna kontrola kvalitete namijenjena za uporabu s testovima SARS-CoV-2 za praćenje učinkovitosti određenog testa. Ova kontrola se koristi za praćenje odsustva SARS-CoV-2. Rutinska uporaba kontrole EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control omogućuje laboratorijima evaluiranje variranja njihovih molekularnih testova tijekom dana ili između serija, kao i provjeru stručnosti osoblja koje provodi testove.

OPIS PROIZVODA:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control sadrži DNK humanog genoma i negativan je na SARS-CoV-2. Kontrola je namijenjena za ispitivanje cijelokupnog procesa molekularnog testiranja, uključujući ekstrakciju, amplifikaciju i detekciju.

Kontrola EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control je interna vrijednost koja se dodjeljuje primjenom metode Bio-Rad Digital Droplet PCR (ddPCR). Kontrola EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control formulirana je u sintetičkom matriksu koji sadrži konzervanse.

POSTUPAK:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control zahtijeva korak ekstrakcije. Kontrolom treba postupati na sličan način kao i s ostalim ispitivanim uzorcima. To rukovatelju omogućuje ocjenu vlastite tehnike ekstrakcije.

Kontrola EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control netestirana je kontrola i nema dodijeljene vrijednosti. Kontrola nije zamjena za proizvođačeve kontrole kompleta koje se isporučuju uz test. Kontrolu EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control treba testirati u skladu s uputama i preporukama proizvođača testa ili ispitnog laboratorija. Očekivane rezultate uporabe kontrole EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control treba odrediti krajnji korisnik za svoj konkretni test.

ČUVANJE I RUKOVANJE:

Kontrolu EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control treba čuvati na temperaturi od -20 °C ili niže.

Odmrznite EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control na sobnoj temperaturi i kratko promješajte prije uporabe.

Nakon odmrzavanja, EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control stabilan je 24 sata ako se čuva na 2-8°C. Sav neutrošeni materijal mora se zbrinuti u otpad nakon jedne uporabe. Nemojte ponovno upotrijebiti. Nemojte razrjeđivati.

Nemojte upotrebljavati EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control nakon isteka roka uporabe.

OGRANIČENJA:

Za in vitro dijagnostičku primjenu.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control se treba smatrati biološki opasnim. Potrebno je pridržavati se opće prihvaćenih mjera opreza i postupaka pravilnog zbrinjavanja¹. Nemojte pipetirati ustima. Nemojte pušiti, jesti ili piti u prostorima u kojima se rukuje uzorcima.

Odbacite proizvod ako je pakiranje oštećeno ili propušta. Tekućine, materijale ili prolivene tvari dezinficirajte 0,5 %-tom otopinom natrijeva hipoklorita. Zbrinite sve materijale i tekućine koje se upotrebljavaju u postupku kao da sadrže patogene agense.

LITERATURA:

¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec, 35 (10 Suppl 2): S65-164.
U određenim su jurisdikcijama, BIO-RAD i DROPLET DIGITAL PCR zaštitni znaci tvrtke Bio-Rad Laboratories, Inc.

ZNAČENJE SIMBOLA:

Kataloški broj



Broj serije



Za in vitro dijagnostičku primjenu



Biološki rizici



Datum isteka valjanosti



Gornja temperaturna granica



Proizvođač



Oprez



Pogledajte upute za uporabu




Negativna kontrola



Europska oznaka sukladnosti



Ovlašteni predstavnik



Emergo Europe
Prinsessegacht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
United States

Souhrn pro EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control	
Katalogové číslo	COV000CE
Reaktivní analyt	Lidská genomová DNA
Non-reaktivní analyt	SARS-CoV-2
Matrix	Syntetická matrix
Konzervant	Azid sodný
Skladování	-20 °C nebo nižší
Objem náplně	0,3 ml
Počet lahviček v sadě	5 lahviček
Počet použití	Jednorázové použití
Doba použitelnosti	12 měsíců od data výroby
Bezpečnostní opatření	Biologická rizika
Regulační status	Pro diagnostické použití in vitro

URČENÉ POUŽITÍ:

Produkt EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control je vzorek pro externí kontrolu kvality určený k použití s analýzami SARS-CoV-2 k monitorování výkonu dané analýzy. Kontrolní vzorek se používá ke stanovení nepřítomnosti SARS-CoV-2. Rutinní používání EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control laboratořím umožňuje vyhodnocovat odchylinky molekulárních analýz mezi jednotlivými dny a šaržemi a testovat dovednosti laborantů.

POPIS PRODUKTU:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control obsahuje lidskou genomovou DNA a je negativní na SARS-CoV-2. Kontrolní vzorek je určen k testování celého procesu molekulární analýzy včetně extrakce, amplifikace a detekce.

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control má interně přidělené hodnoty pomocí digitální kapkové PCR Bio-Rad (ddPCR). EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control je formulován v syntetické matrix obsahující konzervanty.

POSTUP:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control vyžaduje krok extrakce. S kontrolním vzorkem je třeba nakládat stejně jako s dalšími testovanými vzorky. To laborantovi umožňuje vyhodnotit svoji extrakční techniku.

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control je neanalyzovaný kontrolní vzorek a nemá přidělené hodnoty. Kontrolní vzorek není nahrazen kontrolními vzorky ze soupravy výrobce poskytnuté spolu s analýzou. EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control je třeba skladovat v souladu s pokyny a doporučeními výrobce analýzy nebo testující laboratoře. Očekávané výsledky použití EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control musí stanovit koncový uživatel konkrétní analýzy.

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE:

Produkt EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control je třeba skladovat při teplotě -20 °C nebo nižší.

Rozmrazte EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control při pokojové teplotě a před použitím krátce protřejte.

Po rozmrazení je EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control stabilní pro dobu 24 hodin při skladování při teplotě 2–8 °C. Jakýkoli zbyvající materiál musí být po jednom použití zlikvidován. Nepoužívejte opakovaně. Produkt neřeďte.

Nepoužívejte EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control po uplynutí data exspirace.

OMEZENÍ:

Pro diagnostické použití in vitro.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control je potřeba považovat za biologicky nebezpečný materiál. Je třeba dodržovat obecná bezpečnostní opatření a pokyny pro správnou likvidaci¹. Nepipetejte ústy. Nekuřte, nejezte ani nepijte v místech, kde je manipulováno se vzorky.

Produkt zlikvidujte, pokud je obal poškozený nebo prosakuje. Tekutiny, materiály nebo rozlitý produkt vydezinfikujte 0,5% roztokem chlornanu sodného. Zlikvidujte veškeré materiály a tekutiny použité v rámci postupu, jako kdyby obsahovaly patogenní činidla.

ODKAZY:

¹Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec, 35 (10 Suppl 2): S65-164.

BIO-RAD a DROPLET DIGITAL PCR jsou v určitých jurisdikcích ochranné známky společnosti Bio-Rad Laboratories, Inc.

POUŽITÉ SYMBOLY:

Katalogové číslo



Číslo šarže



Pro diagnostické použití in vitro



Biologická rizika



Datum exspirace



Horní teplotní limit



Výrobce



Upozornění



Čtěte návod k použití



Negativní kontrolní vzorek



Evropská značka shody



Oprávněný zástupce



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
United States

Výrobce: Exact Diagnostics LLC, 3400 Camp Bowie Blvd. CBH-214, Fort Worth, Texas 76107
Pro asistenci a opětovné objednání nás kontaktujte na e-mailové adrese customerservice@exactdiagnostics.com nebo

telefonním čísle **817.989.9262**

www.exactdiagnostics.com

PI0106-ROW Rev. 01.00

Oversigt over EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control	
Katalognummer	COV000CE
Reaktiv analyt	Humant genom-DNA
Ikke-reakтив analyt	SARS-CoV-2
Matrix	Syntetisk matrix
Konservéringsmiddel	Natriumazid
Opbevaring	-20 °C eller derunder
Fyldningsvolumen	0,3 ml
Antal hætteglas pr. sæt	5 hætteglas
Antal anvendelser	Engangsbrug
Holdbarhed	12 måneder fra fremstillingsdatoen
Forholdsregler	Biologiske risici
Reguleringsstatus	Til in vitro-diagnostisk brug

TILSIGTET ANVENDELSE:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control er en ekstern kvalitetskontrol, der er beregnet til brug med SARS-CoV-2-analyser til overvågning af ydelsen af den pågældende analyse. Kontrollen bruges til at overvåge fraværet af SARS-CoV-2. Rutinemæssig brug af EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control gør det muligt for laboratorier at evaluere variationen af deres molekylære analyse fra dag til dag og fra lot til lot og at teste operatørers færdigheder.

PRODUKTBESKRIVELSE:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control indeholder humant genom-DNA og er negativ for SARS-CoV-2. Kontrollen er beregnet til at teste hele forløbet af en molekylær analyse, inklusive ekstraktion, forstærkning og påvisning.

Værdierne af EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control tilknyttes internt ved brug af Bio-Rad Digital Droplet PCR (ddPCR). EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control er fremstillet i syntetisk matrix, som indeholder konserveringsmidler.

PROCEDURE:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control kræver et ekstraktionstrin. Kontrollen skal behandles på samme måde som andre testede prøver. Dermed kan brugeren evaluere ekstraktions teknikken.

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control er en uanalyseret kontrol uden tilknyttede værdier. Kontrollen må ikke anvendes i stedet for producentens kontroller, der medfølger i sættet med analysen. EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control skal testes i henhold til analyseproducentens eller laboratoriets anvisninger og anbefalinger. De forventede resultater af EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control skal bestemmes af brugeren for den pågældende analyse.

OPBEVARING OG HÅNDTERING:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control skal opbevares ved -20 °C eller derunder.

Optø EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control ved stuetemperatur, og bland den kortvarigt i en vortex-mixer, inden den tages i brug.

Efter optøning er EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control stabil i 24 timer, når den opbevares ved 2-8 °C. Eventuelle resterende materialer skal bortskaffes efter en enkelt anvendelse. Må ikke genbruges. Må ikke fortyndes.

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control må ikke anvendes efter holdbarhedsdatoen.

BEGRÆNSNINGER:

Til in vitro-diagnostisk brug.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control skal anses for at være biologisk farlig. Generelle forholdsregler og korrekte bortskaffelsesmetoder skal følges¹. Anvend ikke mundpipetting. Det er ikke tilladt at ryge, spise eller drikke i områder, hvor prøverne håndteres.

Produktet skal bortskaffes, hvis emballagen er beskadiget eller utæt. Væske, materialer eller spild skal desinficeres med en 0,5 % natriumhypochloritopløsning. Ved bortskaffelsen skal alle anvendte materialer og væske i proceduren håndteres, som om de indeholdt smitsomme stoffer.

REFERENCER:

- ¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec, 35 (10 Suppl 2): S65-164.
BIO-RAD og DROPLET DIGITAL PCR er varemærker tilhørende Bio-Rad Laboratories, Inc. i visse jurisdiktioner.

SYMBOLFORKLARING:

Katalognummer



Lotnummer



Til in vitro-diagnostisk brug



Biologiske risici



Holdbarhedsdato



Øvre temperaturgrænse



Producent



Forsiktig



Se brugsanvisningen



Negativ kontrol



CE-mærkning



EC



REP

Autoriseret repræsentant



EC



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
United States

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control Summary	
Catalogue number	COV000CE
Reactive analyte	Human Genomic DNA
Nonreactive analyte	SARS-CoV-2
Matrix	Synthetic Matrix
Preservative	Sodium azide
Storage	-20°C or below
Fill volume	0.3mL
Number of vials per kit	5 vials
Number of uses	Single use
Shelf life	12 Months from date of manufacture
Precautions	Biological risks
Regulatory status	For in vitro diagnostic use

INTENDED USE:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control is an external quality control intended to be used with SARS-CoV-2 assays to monitor the performance of that given assay. The control is used to monitor the absence of SARS-CoV-2. Routine use of EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control allows laboratories to evaluate day-to-day and lot-to-lot variation of their molecular assay and test for operator proficiency.

PRODUCT DESCRIPTION:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control contains Human Genomic DNA and is negative for SARS-CoV-2. The control is intended to test the entire process of a molecular assay including extraction, amplification, and detection.

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control is internally value assigned using Bio-Rad Digital Droplet PCR (ddPCR). EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control is formulated in Synthetic Matrix, which contains preservatives.

PROCEDURE:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control requires an extraction step. The control must be treated in a similar manner to other tested samples. This allows the operator to assess their extraction technique.

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control is an unassayed control and does not have assigned values. The control is not a substitute for the manufacturer's kit controls provided with the assay. EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control is to be tested according to the assay manufacturer's or testing laboratory's instructions and recommendations. Expected results using EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control must be established by the end user for their specific assay.

STORAGE AND HANDLING:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control should be stored at -20°C or below.

Thaw EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control at room temperature and vortex briefly prior to use.

Once thawed, EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control is stable for 24 hours when stored at 2-8°C. Any remaining materials must be disposed of after one use. Do not reuse. Do not dilute.

Do not use EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control beyond the expiration date.

LIMITATIONS:

For in vitro diagnostic use.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control should be considered biohazardous. Universal precautions and proper disposal should be practised¹. Do not pipette by mouth. Do not smoke, eat, or drink in areas where specimens are handled.

Discard product if packaging is damaged or leaking. Disinfect liquids, materials or spills with a 0.5% sodium hypochlorite solution. Dispose of all materials and liquids used in the procedure as if they contained pathogenic agents.

REFERENCES:

- ¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec, 35 (10 Suppl 2): S65-164.
BIO-RAD and DROPLET DIGITAL PCR are trademarks of Bio-Rad Laboratories, Inc. in certain jurisdictions.

SYMBOL REFERENCES:

Catalogue number



Lot number



For in vitro diagnostic use



Biological risks



Expiration date



Upper limit of temperature



Manufacturer



Caution



Consult instructions for use



Negative control



European Mark of Conformity



EC



Authorised representative



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
United States

Manufactured by: Exact Diagnostics LLC, 3400 Camp Bowie Blvd. CBH-214, Fort Worth, Texas 76107
For assistance and reordering, contact customerservice@exactdiagnostics.com or **817.989.9262**

www.exactdiagnostics.com

PI0106-ROW Rev. 01.00

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control kokkuvõte	
Kataloogi number	COV000CE
Reaktiivne analüüt	Inimese genoomne DNA
Mittereaktiivne analüüt	SARS-CoV-2
Maatriks	Sünteetiline maatriks
Säilitusaine	Naatriumasiid
Säilitamine	-20 °C või madalam
Täitemaht	0,3 ml
Viaalide arv komplektis	5 viaali
Kasutuskordade arv	Ühekordne kasutus
Kölblikkusaeg	12 kuud alates tootmiskuupäevast
Ettevaatusabinõud	Bioogiline oht
Nõuetele vastavus	Kasutamiseks <i>in vitro</i> diagnostikas

ETTENÄHTUD KASUTUS

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control on väline kvaliteedikontroll, mida kasutatakse SARS-CoV-2 analüüsides soorituse jälgimiseks. Kontrollmaterjal kasutatakse SARS-CoV-2 puudumise jälgimiseks. EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control korrapäane kasutamine võimaldab laboritel hinnata oma molekulaaranalüüside päevade- ja partiidevahelist varieeruvust ja kasutaja suutlikkust.

TOOTE KIRJELDUS

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control sisaldab inimese genoomset DNA-d ja on SARS-CoV-2 suhtes negatiivne. Kontrollmaterjal on möeldud kogu molekulaaranalüüsi protsessi testimiseks, sh ekstraktsioon, võimendamine ja tuvastamine.

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control on saanud sisemiselt määratud väärtsuse vastavalt Bio-Rad Digital Droplet PCR-ile (ddPCR). EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control asub sünteetilises maatriksis, mis sisaldab säilitusaineid.

PROTSEDUUR

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control nõuab ekstraktsiooni. Kontrollmaterjali tuleb käsitseda samamoodi nagu teisi testitavaid proove. See võimaldab operaatoril hinnata oma ekstraktsionitehnikat.

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control on analüüsimata kontrollmaterjal ja sellel ei ole määratud väärtsusi. Kontrollmaterjal ei asenda koos analüüsiga tarnitavaid tootja komplekti kuuluvaid kontolle. EDX SARS-CoV-2 Negative Run Controli tuleb testida vastavalt analüüsi tootja või testimislabori juhistele ja soovitustele. EDX SARS-CoV-2 Negative Run Controli eeldatavad tulemused peab oma spetsiifilise analüüsi jaoks kehtestama lõppkasutaja.

SÄILITAMINE JA KÄSITSEMINÉ

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Controli tuleb hoida temperatuuril -20 °C või madalamal temperatuuril.

Laske EDX SARS-CoV-2 Negative Run Controlil toatemperatuuril sulada ja keeristage enne kasutamist lühidalt.

Pärast sulatamist on EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control stabiilne 24 tundi temperatuuril 2–8 °C. Ülejäänud materjalid tuleb pärast üht kasutamist ära visata. Ärge kasutage korduvalt. Ärge lahjendage.

Ärge kasutage toodet EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control pärast aegumiskuupäeva.

PIIRANGUD

Kasutamiseks *in vitro* diagnostikas.

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control tuleb lugeda bioohutlikuks. Rakendada tuleb universaalseid ettevaatusabinõusid ja kohaseid kõrvaldamisvõtteid¹. Ärge pipettige suuga. Ärge suitsetage, sööge ega jooge proovide käitlemise alas.

Visake toode ära, kui selle pakend on kahjustatud või lekib. Desinfitseerige vedelikud, materjalid või lekked 0,5% naatriumhüpokloriti lahusega. Kõrvaldage kõik protseduuris kasutatud materjalid ja vedelikud, nagu nad sisaldaksid patogeenseid aineid.

VIITED

¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec, 35 (10 Suppl 2): S65-164.
BIO-RAD ja DROPLET DIGITAL PCR on teatavates jurisdiktsioonides ettevõtte Bio-Rad Laboratories kaubamärgid.

TINGMÄRGID



Kataloogi number



Partii number



Kasutamiseks in vitro diagnostikas



Bioloogiline oht



Aegumiskuupäev



Temperatuuri ülempiir



Tootja



Ettevaatust!



Tutvuge kasutusjuhistega



Negatiivne kontrollmaterjal



Euroopa vastavusmärgis



Volitatud esindaja



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
Madalmaad



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
Ameerika Ühendriigid

Résumé de l'EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control	
Référence	COV000CE
Analyte réactif	ADN du génome humain
Analyte non réactif	SARS-CoV-2
Matrice	Matrice synthétique
Conservateur	Azoture de sodium
Conservation	-20 °C ou moins
Volume	0,3 ml
Nombre de flacons par kit	5 flacons
Nombre d'utilisations	Usage unique
Durée de vie	12 mois à partir de la date de fabrication
Précautions	Risques biologiques
Statut réglementaire	Pour usage diagnostic in vitro

UTILISATION :

L'EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control est un contrôle de qualité externe destiné à être utilisé avec des analyses du SARS-CoV-2 afin de contrôler la performance de cette analyse donnée. Le contrôle sert à surveiller l'absence de SARS-CoV-2. L'utilisation régulière de l'EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control permet aux laboratoires d'évaluer les variations d'un jour à l'autre et d'un lot à l'autre de leur analyse moléculaire, ainsi que de tester les compétences de l'opérateur.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

L'EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control contient de l'ADN du génome humain et est négatif pour le SARS-CoV-2. Le contrôle est destiné à tester le procédé d'une analyse moléculaire dans son ensemble, extraction, détection et amplification comprises.

L'EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control dispose d'une valeur assignée en interne par le PCR numérique à gouttelettes Bio-Rad (ddPCR). L'EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control est formulé en matrice synthétique, qui contient des conservateurs.

PROCÉDURE :

L'EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control exige une étape d'extraction. Le contrôle doit être traité d'une manière semblable aux autres échantillons testés. Cela permet à l'opérateur d'évaluer sa technique d'extraction.

L'EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control est un contrôle non titré et ne possède pas de valeurs assignées. Le contrôle n'est pas conçu pour remplacer les contrôles de kit du fabricant fournis avec l'analyse. L'EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control doit être testé conformément aux instructions et recommandations du fabricant d'analyse ou du laboratoire de tests. Les résultats attendus de l'utilisation de l'EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control doivent être déterminés par l'utilisateur final pour son analyse spécifique.

CONSERVATION ET MANIPULATION :

L'EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control doit être conservé à une température de -20 °C ou moins.

Décongeler l'EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control à température ambiante et l'homogénéiser brièvement au vortex avant de l'utiliser.

Une fois décongelé, l'EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control est stable pendant 24 heures lorsqu'il est conservé à une température comprise entre 2 et 8 °C. Tous les produits restants doivent être éliminés après une utilisation. Ne pas réutiliser. Ne pas diluer.

Ne pas utiliser l'EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control au-delà de la date de péremption.

LIMITES :

Pour une utilisation de diagnostic in vitro.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS :

L'EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control doit être considéré comme présentant un risque biologique. Il convient de tenir compte des précautions universelles et de procéder à une élimination appropriée¹. Ne pas prélever à la pipette avec la bouche. Ne pas fumer, manger ou boire dans les zones de manipulation des échantillons.

Éliminer le produit si l'emballage est endommagé ou présente une fuite. Désinfecter les liquides, substances ou déversements au moyen d'une solution à base d'hypochlorite de sodium à 0,5 %. Éliminer toutes les substances et tous les liquides utilisés dans le cadre de la procédure comme s'ils contenaient des agents pathogènes.

RÉFÉRENCES :

¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec, 35 (10 Suppl 2): S65-164.

BIO-RAD et DROPLET DIGITAL PCR sont des marques de commerce de Bio-Rad Laboratories, Inc. dans certaines jurisdictions.

LEXIQUE DES SYMBOLES :



Référence



Numéro de lot



Pour usage diagnostic in vitro



Risques biologiques



Date de péremption



Limite supérieure de température



Fabricant



Attention



Consulter le mode d'emploi



Produit de contrôle négatif



Marque européenne de conformité



Mandataire



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
United States

Übersicht über die EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control	
Katalognummer	COV000CE
Reaktiver Analyt	Humangenom-DNA
Nicht reaktiver Analyt	SARS-CoV-2
Matrix	Synthetische Matrix
Konservierungsmittel	Natriumazid
Lagerung	-20 °C oder niedriger
Füllvolumen	0,3 ml
Anzahl der Fläschchen pro Kit	5 Fläschchen
Wiederverwendbarkeit	Nicht wiederverwendbar
Haltbarkeit	12 Monate ab Herstellungsdatum
Vorsichtsmaßnahmen	Biologische Risiken
Aufsichtsbehördlicher Status	In-vitro-Diagnostikum

VERWENDUNGSZWECK:

Die EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control ist eine externe Qualitätskontrolle, die für die Verwendung mit SARS-CoV-2-Assays zur Überwachung der Leistung des jeweiligen Assays vorgesehen ist. Die Kontrolle wird zur Überwachung des Nichtvorhandenseins von SARS-CoV-2 verwendet. Durch die routinemäßige Verwendung der EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control können Labore die tägliche und chargenweise Variation ihres molekularen Assays untersuchen und die Anwenderkompetenz testen.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Die EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control enthält Humangenom-DNA und ist negativ für SARS-CoV-2. Die Kontrolle dient zum Testen des gesamten Prozesses eines molekularen Assays einschließlich Extraktion, Amplifikation und Detektion.

Für die EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control werden mithilfe mittels Digital Droplet PCR (ddPCR) von Bio-Rad intern Zielwertangaben gemacht. Die EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control ist in einer synthetischen, konservierungsmittelhaltigen Matrix formuliert.

VERFAHREN:

Die EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control setzt einen Extraktionsschritt voraus. Die Kontrolle muss auf ähnliche Weise wie andere getestete Proben behandelt werden. Auf diese Weise kann der Anwender seine Extraktionsmethode beurteilen.

Die EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control ist eine Nicht-Assay-Kontrolle ohne zugewiesene Werte. Die Kontrolle ist kein Ersatz für die mit dem Assay bereitgestellten Kit-Kontrollen des Herstellers. Die EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control ist gemäß den Anweisungen und Empfehlungen des Assay-Herstellers oder Prüflabors zu testen. Erwartete Ergebnisse unter Verwendung der EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control müssen vom Endanwender für den jeweiligen Assay ermittelt werden.

LAGERUNG UND HANDHABUNG:

Die EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control sollte bei -20 °C oder niedriger gelagert werden.

Die EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control sollte kurz vor dem Gebrauch bei Raumtemperatur aufgetaut und gemischt werden.

Nach dem Auftauen ist die EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control bei Lagerung bei 2 bis 8° C 24 Stunden lang haltbar. Alle verbliebenen Materialien müssen nach dem einmaligen Gebrauch entsorgt werden. Nicht wiederverwenden. Nicht verdünnen.

Die EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control darf nicht über das Haltbarkeitsdatum hinaus verwendet werden.

EINSCHRÄNKUNGEN:

In-vitro-Diagnostikum.

WARNUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN:

Die EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control sollte als biogefährlich eingestuft werden. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und eine ordnungsgemäße Entsorgung sind zu beachten.¹ Nicht oral pipettieren. In Bereichen, in denen mit Proben gearbeitet wird, nicht rauchen, essen oder trinken.

Bei Beschädigung oder Undichtigkeit der Verpackung das Produkt entsorgen. Flüssigkeiten, Materialien oder Verschüttungen mit einer 0,5%igen Natriumhypochloritlösung desinfizieren. Alle Materialien und Flüssigkeiten, die im Verfahren verwendet werden, so entsorgen, als enthielten sie Krankheitserreger.

LITERATUR:

- ¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec, 35 (10 Suppl 2): S65-164.
BIO-RAD und DROPLET DIGITAL PCR sind Marken von Bio-Rad Laboratories, Inc. in bestimmten Gerichtsbarkeiten.

SYMBOLVERWEISE:

Katalognummer



Chargenbezeichnung



In-vitro-Diagnostikum



Biologische Risiken



Haltbarkeitsdatum



Obere Temperaturgrenze



Hersteller



Achtung



Gebrauchsanleitung beachten




Negativ kontrolle



Europäisches Konformitätszeichen



Autorisierte Vertretung



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
Niederlande



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
USA

Γενικά στοιχεία για το EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control	
Αριθμός καταλόγου	COV000CE
Αντιδρώσα αναλυόμενη ουσία	Ανθρώπινο γονιδιωματικό DNA
Μη αντιδρώσα αναλυόμενη ουσία	SARS-CoV-2
Μήτρα	Συνθετική μήτρα
Συντηρητικό	Αζίδιο του νατρίου
Φύλαξη	-20 °C ή χαμηλότερη θερμοκρασία
Όγκος πλήρωσης	0,3 ml
Αριθμός σωληναρίων ανά κιτ	5 σωληνάρια
Αριθμός χρήσεων	Μία χρήση
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής
Προφυλάξεις	Βιολογικοί κίνδυνοι
Κανονιστικό καθεστώς	Για διαγνωστική χρήση in vitro

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

To EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control είναι ένας εξωτερικός μάρτυρας ποιότητας με ενδεδειγμένη χρήση σε δοκιμασίες προσδιορισμού SARS-CoV-2 για την παρακολούθηση της απόδοσης της συγκεκριμένης δοκιμασίας προσδιορισμού. Ο μάρτυρας χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της απουσίας SARS-CoV-2. Η τακτική χρήση του EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control επιτρέπει στα εργαστήρια να αξιολογούν τις διακυμάνσεις των μοριακών δοκιμασών προσδιορισμού από ημέρα σε ημέρα και από παρτίδα σε παρτίδα, καθώς και να εκτελούν δοκιμές των ικανοτήτων των χειριστών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

To EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control περιέχει ανθρώπινο γονιδιωματικό DNA και είναι αρνητικό για τον ίο SARS-CoV-2. Ο μάρτυρας προορίζεται για την εκτέλεση δοκιμών σε ολόκληρη τη διαδικασία μοριακής δοκιμασίας προσδιορισμού, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής, της ενίσχυσης και της ανίχνευσης.

Στο EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control έχουν εκχωρηθεί εσωτερικά τιμές αναφοράς με χρήση ψηφιακού PCR τεχνολογίας σταγονιδίων (ddPCR) της Bio-Rad. To EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control παρασκευάζεται σε μήτρα συνθετικού εγκεφαλονωτιαίου υγρού, η οποία περιέχει συντηρητικά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Το EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control απαιτεί βήμα εξαγωγής. Ο μάρτυρας πρέπει να υφίσταται ανάλογη επεξεργασία με τα άλλα δείγματα δοκιμών. Αυτό επιτρέπει στον χειριστή να αξιολογήσει την τεχνική εξαγωγής του.

Το EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control είναι μη πιστοποιημένος μάρτυρας ελέγχου και δεν διαθέτει τιμές αναφοράς. Ο μάρτυρας δεν αποτελεί υποκατάστατο των ελέγχων που περιλαμβάνονται στο κιτ του κατασκευαστή που παρέχεται με τη διαδικασία προσδιορισμού. Το EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control θα πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμές βάσει των οδηγιών και υποδείξεων του κατασκευαστή της διαδικασίας προσδιορισμού ή του εργαστηρίου δοκιμών. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα με χρήση του EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control θα πρέπει να καθοριστούν από τον τελικό χρήστη για τη συγκεκριμένη διαδικασία προσδιορισμού.

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:

Το EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control θα πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία -20 °C ή χαμηλότερη.

Αποψύξτε το EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control σε θερμοκρασία δωματίου και στροβιλίστε το για μικρό χρονικό διάστημα πριν από τη χρήση.

Μετά την απόψυξη, το EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control παραμένει σταθερό για 24 ώρες όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2-8 °C. Μετά από κάθε χρήση, θα πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα τα υλικά που έχουν ενδεχομένως απομείνει. Μην επαναχρησιμοποιείτε. Μην αραιώνετε.

Μη χρησιμοποιείτε το EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control μετά από την ημερομηνία λήξης του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

Για διαγνωστική χρήση in vitro.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Το EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control θα πρέπει να θεωρείται ότι περικλείει βιολογικούς κινδύνους. Θα πρέπει να λαμβάνονται γενικές προφυλάξεις και να γίνεται ορθή απόρριψη¹. Μην αναρροφάτε με πιπέτα με το σόμα. Μην καπνίζετε, μην τρώτε και μην πίνετε σε χώρους χειρισμού δειγμάτων.

Απορρίψτε το προϊόν αν η συσκευασία είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει διαρροή. Τα υγρά, τα υλικά, ή τα χυμένα υγρά θα πρέπει να απολυμαίνονται με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,5%. Όλα τα υλικά και τα υγρά που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία θα πρέπει να απορρίπτονται ως υλικά που περιέχουν παθογόνους παράγοντες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec, 35 (10 Suppl 2): S65-164.

Τα BIO-RAD και DROPLET DIGITAL PCR είναι εμπορικά σήματα της Bio-Rad Laboratories, Inc. σε ορισμένες δικαιοδοσίες.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ:



Αριθμός καταλόγου



Αριθμός παρτίδας



Για διαγνωστική χρήση in vitro



Βιολογικοί κίνδυνοι



Ημερομηνία λήξης



Άνω όριο θερμοκρασίας



Κατασκευαστής



Προσοχή



Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης



Αρνητικός μάρτυρας



Ευρωπαϊκή σήμανση συμμόρφωσης



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
United States

Az EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control összefoglalója	
Katalógusszám	COV000CE
Reaktív analit	Humán genomiális DNS
Nem reaktív analit	SARS-CoV-2
Mátrix	Szintetikus mátrix
Tartósítószerek	nátrium-azid
Tárolás	-20° C vagy alacsonyabb hőmérsékleten
Töltötérfogat	0.3mL
Ampullák száma tesztkészletenként	5 ampulla
Alkalmazásszám	Egyszer használatos
Alkalmazhatósági idő	A gyártástól számított 12 hónap
Óvintézkedések	Biológiai kockázatok
Szabályozási állapot	In vitro diagnosztikai felhasználásra

FELHASZNÁLÁS:

Az EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control egy külső minőség-ellenőrzési lehetőség, amely a SARS-CoV-2 vizsgálatokkal együtt használatos arra, hogy az adott vizsgálat teljesítményét figyelni lehessen. A kontroll a SARS-CoV-2 kizárásnak ellenőrzésére szolgál. Az EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control rutin használata lehetővé teszi a laboratóriumok számára, hogy felmérjék a molekuláris vizsgálat naponkénti és tételenkénti változását, valamint teszteljék a kezelői jártasságot.

TERMÉKLEÍRÁS:

Az EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control humán genomiális DNS-t tartalmaz, és a SARS-CoV-2 esetében negatív eredményt ad. A kontroll célja a molekuláris vizsgálat teljes folyamatának tesztelése, beleértve az extrakciót, amplifikációt és detektálást.

Az EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control értékét belsőleg a Bio-Rad Digital Droplet PCR (ddPCR) segítségével rendelték hozzá. Az EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control szintetikus mátrixban van összeállítva, amely tartósítószereket tartalmaz.

ELJÁRÁS:

Az EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control extrakciós lépést igényel. A kontrollt a többi vizsgálati mintához hasonlóan kell kezelni. Ez lehetővé teszi a kezelőnek az extrakciós technika értékelését.

Az EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control nem ellenőrzött kontroll, és nincs hozzárendelt értéke. A kontroll nem helyettesíti a gyártó által a vizsgálathoz mellékelt készletkontrollt. Az EDX SARS-CoV-2 Negative Run Controlt a vizsgálati gyártó vagy a tesztelő laboratórium utasításainak és ajánlásainak megfelelően kell tesztelni. Az EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control használatával várható eredményeket a végfelhasználónak kell megállapítania az adott vizsgálathoz.

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS:

Az EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control -20°C-on vagy alacsonyabb hőmérsékleten tárolandó.

Az EDX SARS-CoV-2 Negative Run Controlt szobahőmérsékleten olvassa ki, és használat előtt egy kicsit vortexelje.

Az EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control 24 órán át stabil marad 2-8°C-on. A megmaradt anyagokat használat után megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Nem szabad újra felhasználni. Nem szabad hígítani.

Ne használja az EDX SARS-CoV-2 Negative Run Controlt a lejáratú idő után.

KORLÁTOZÁSOK:

In vitro diagnosztikai felhasználásra.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Az EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control biológiaileg veszélyesnek minősül. Be kell tartani az általános óvintézkedéseket, és gondoskodni kell a megfelelő ártalmatlanításról¹. Ne cseppentse a szájába. Ne dohányozzon, ne egyen, ne igyon a minták kezelési területén

Dobja ki a terméket, ha a csomagolás sérült vagy szivárog. A kiömlött folyadékot, anyagokat vagy foltokat 0,5% nátrium-hipoklorit oldattal fertőtlenítse. Az eljárásban használt minden anyagot és folyadékot úgy kell ártalmatlanítani, mintha kórokozókat tartalmaznának.

IRODALOMJEGYZÉK:

¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec; 35 (10 Suppl 2): S65-164.

BIO-RAD és DROPLET DIGITAL PCR bizonyos joghatóságokban a Bio-Rad Laboratories, Inc. védjegyei.

JELMAGYARÁZAT:

Katalógusszám



Tételszám



In vitro diagnosztikai felhasználásra



Biológiai kockázatok



Lejáratú dátum



Hőmérséklet felső határa



Gyártó



Figyelem



Olvassa el a használati utasítást




Negatív kontroll



Európai megfelelőségi jelölés



Hivatalos képviselet



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
United States

Gyártó: Exact Diagnostics LLC, 3400 Camp Bowie Blvd. CBH-214, Fort Worth, Texas 76107

Ha segítségre van szüksége, vagy szeretne utánrendelni, lépjen velünk kapcsolatba:

customerservice@exactdiagnostics.com vagy **817.989.9262**

www.exactdiagnostics.com

PI0106-ROW Rev. 01.00

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control - Riepilogo	
Numero di catalogo	COV000CE
Analita reattivo	DNA genomico umano
Analita non reattivo	SARS-CoV-2
Matrice	Matrice sintetica
Conservante	Azoturo di sodio
Conservazione	-20 °C o inferiore
Volume di prodotto	0,3 ml
Numero di fiale per kit	5 fiale
Numero di usi	Monouso
Periodo di validità	12 mesi dalla data di fabbricazione
Precauzioni	Rischi biologici
Situazione normativa	Per uso diagnostico in vitro

USO PREVISTO

Il controllo EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control è un controllo di qualità esterno, destinato all'uso con i dosaggi di SARS-CoV-2 per monitorare le prestazioni degli stessi. Viene utilizzato per monitorare l'assenza del SARS-CoV-2. L'uso abituale del controllo EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control consente ai laboratori di valutare la variazione da un giorno all'altro e da un lotto all'altro del dosaggio molecolare e testare le competenze dell'operatore.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il controllo EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control contiene DNA genomico umano ed è negativo per il SARS-CoV-2. È destinato al test dell'intero processo di un dosaggio molecolare, compresi l'estrazione, l'amplificazione e il rilevamento.

Al controllo EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control vengono assegnati internamente dei valori con la tecnologia Bio-Rad Digital Droplet PCR (ddPCR). Il controllo EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control è formulato in una matrice sintetica che contiene dei conservanti.

PROCEDURA

Il controllo EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control richiede una fase di estrazione. Deve essere trattato in modo simile agli altri campioni testati. In questo modo l'operatore può valutare la tecnica di estrazione.

Il controllo EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control non è dosato e ad esso non sono assegnati valori. Non è un sostituto per i controlli del kit del produttore forniti con il dosaggio. Il controllo EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control deve essere sottoposto a test secondo le istruzioni e le raccomandazioni del produttore del dosaggio o del laboratorio di analisi. I risultati previsti ottenuti utilizzando il controllo EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control devono essere stabiliti dall'utente finale per il dosaggio specifico.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE

Conservare il controllo EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control a una temperatura massima di -20 °C.

Scongelare il controllo EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control a temperatura ambiente e agitarlo brevemente in vortex prima dell'uso.

Una volta scongelato, il controllo EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control rimane stabile per 24 ore, se conservato a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C. Dopo un utilizzo, smaltire gli eventuali materiali rimanenti. Non riutilizzare. Non diluire.

Non utilizzare il controllo EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control oltre la data di scadenza.

LIMITI

Per uso diagnostico in vitro.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Il controllo EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control deve essere considerato un rischio biologico. Adottare precauzioni universali e seguire la procedura di smaltimento appropriata¹. Non pipettare con la bocca. Non fumare, mangiare o bere nelle aree in cui vengono trattati i campioni.

Smaltire il prodotto se l'imballaggio è danneggiato o perde. Disinfettare i liquidi, i materiali o i versamenti con una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5%. Smaltire tutti i materiali e i liquidi utilizzati nella procedura come se contenessero agenti patogenici.

BIBLIOGRAFIA

- ¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec, 35 (10 Suppl 2): S65-164.
BIO-RAD e DROPLET DIGITAL PCR sono marchi commerciali di Bio-Rad Laboratories, Inc. in determinate giurisdizioni.

LEGENDA DEI SIMBOLI

Numero di catalogo



Numero di lotto



Per uso diagnostico in vitro



Rischi biologici



Data di scadenza



Temperatura massima



Produttore



Attenzione



Fare riferimento alle Istruzioni per l'uso




Controllo negativo



Marchio di conformità alla normativa europea



Rappresentante autorizzato



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
United States

Fabbricato da: Exact Diagnostics LLC, 3400 Camp Bowie Blvd. CBH-214, Fort Worth, Texas 76107

Per assistenza e nuovi ordini scrivere a customerservice@exactdiagnostics.com o chiamare il numero **817.989.9262**

www.exactdiagnostics.com

PI0106-ROW Rev. 01.00

„EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control“ santrauka	
Katalogo numeris	COV000CE
Reaktyvi analitė	Žmogaus genomo DNR
Nereaktyvi analitė	SARS-CoV-2
Matrica	Sintetinė matrica
Konservantas	Natrio azidas
Laikymas	-20 °C arba žemesnė
Užpildymo tūris	0,3 ml
Buteliukų skaičius rinkinyje	5 buteliukai
Naudojimų skaičius	Vienkartinis naudojimas
Naudojimo trukmė	12 mėnesių nuo pagaminimo dienos
Atsargumo priemonės	Biologinė rizika
Teisiniis statusas	Skirta in vitro diagnostikos tyrimams

PASKIRTIS:

„EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control“ yra išorinė kokybės kontrolė, skirta naudoti su SARS-CoV-2 tyrimais nurodyto tyrimo atlikimo efektyvumui stebėti. Kontrolė naudojama SARS-CoV-2 nebuvinui stebėti. Jprastinis „EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control“ naudojimas suteikia laboratorijoms galimybę įvertinti kasdienį ir partijos kiekvieno molekulinio tyrimo kitimą ir išbandyti operatoriaus kvalifikaciją.

GAMINIO APRAŠYMAS:

„EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control“ sudėtyje yra žmogaus genomo DNR ir ji neigiamą SARS-CoV-2 atžvilgiu. Kontrolė yra skirta išbandyti visą molekulinio tyrimo procesą, išskaitant ekstrahavimą, aptikimą ir amplifikaciją.

„EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control“ priskiriamą vidinę vertę naudojant „Bio-Rad Digital Droplet PCR“ (ddPCR). „EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control“ yra suformuluota sintetinėje matricoje, kurioje yra konservantų.

PROCEDŪRA:

„EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control“ reikalingas išgavimo veiksmas. Kontrolė turi būti apdorojama panašiai kaip ir kiti ištirti mėginiai. Tai leidžia operatoriui įvertinti jų išgavimo techniką.

„EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control“ yra neištirta kontrolė ir neturi priskirtų verčių. Kontrolė nepakeičia gamintojo rinkinio kontrolių, pateiktų kartu su tyrimu. „EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control“ turi būti testuojama pagal tyrimo gamintojo arba bandymų laboratorijos instrukcijas ir rekomendacijas. Tikėtinus rezultatus naudojant „EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control“ turi nustatyti galutinis naudotojas konkrečiam tyrimui.

LAIKYMAS IR TVARKYMAS:

„EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control“ reikia laikyti -20 °C ar žemesnėje temperatūroje.

Trumpai prieš naudojimą atšildykite „EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control“ kambario temperatūroje ir pamaišykite.

Atšildžius „EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control“ išlieka stabili 24 valandas, kai laikoma 2–8 °C temperatūroje. Po vieno naudojimo visos likusios medžiagos turi būti tinkamai sunaikintos. Nenaudokite pakartotinai. Neskieskite.

Nenaudokite „EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control“ pasibaigus tinkamumo naudoti laikui.

RIBOJIMAI:

Skirta in vitro diagnostikos tyrimams.

ISPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS:

„EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control“ turėtų būti laikoma biologiškai pavojinga. Turėtų būti praktikuojamos visuotinės atsargumo priemonės ir tinkamas šalinimas¹. Nenaudokite burnos kaip pipetės. Nerūkykite, nevalgykite ir negerkite vietose, kur tvarkomi mėginiai.

Jei pakuotė pažeista arba nesandari, išmeskite gaminį. Dezinfekuokite skysčius, medžiagas ar išsiliejimus 0,5 % natrio hipochlorito tirpalu. Visas medžiagas ir skysčius, naudojamus procedūroje, šalinkite taip, lyg juose būtų ligos sukėlėjų.

BIBLIOGRAFIJA:

¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec, 35 (10 Suppl 2): S65-164.

BIO-RAD ir DROPLET DIGITAL PCR yra „Bio-Rad Laboratories, Inc.“ prekės ženklai tam tikrose jurisdikcijose.

SIMBOLIŲ NUORODOS:

Katalogo numeris



Partijos numeris



Skirta in vitro diagnostikos tyrimams



Biologinė rizika



Galiojimo data



Viršutinė temperatūros riba



Gamintojas



Perspėjimas



Žiūrėti naudojimo instrukciją



Neigiamas kontrolė



Europos atitinkies ženklas



Įgaliotasis atstovas



Emergo Europe

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands



Exact Diagnostics LLC

3400 Camp Bowie Blvd CBH-214

Fort Worth Texas 76107

United States

Краток преглед на EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control	
Број на каталог	COV000CE
Реактивен анализант	DНК на човечки геном
Нереактивен анализант	SARS-CoV-2
Матрица	Синтетичка матрица
Конзерванс	Натриум азид
Чување	-20 °C или пониска
Волумен на полнење	0,3 mL
Број на шишенца по комплет	5 шишенца
Број на употреби	Еднократна употреба
Рок на чување	12 месеци од датумот на производство
Мерки на претпазливост	Биолошки ризици
Регулаторен статус	За ин витро дијагностичка употреба

НАМЕНЕТА УПОТРЕБА:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control е надворешна контрола на квалитет наменета за употреба во анализа на SARS-CoV-2 со цел следење на перформансите на анализата. Контролата се користи за следење на отсуството на SARS-CoV-2. Рутинската употреба на EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control им овозможува на лабораториите да ја проценат варијацијата на нивната молекуларна анализа на дневна основа и од серија до серија и да ја тестираат подготвеноста на операторот.

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control содржи ДНК на човечки геном и е негативна за SARS-CoV-2. Контролата е наменета за тестирање на целиот процес на молекуларна анализа, вклучувајќи ги екстракцијата, засилувањето и детекцијата.

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control претставува внатрешно назначена вредност со помош на Bio-Rad Digital Droplet PCR (ddPCR). EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control е формулирана во синтетичка матрица, којашто содржи конзерванси

ПРОЦЕДУРА:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control бара чекор на екстракција. Контролата мора да се третира на сличен начин како и другите тестиирани примероци. Ова овозможува операторот да ја процени нивната техника на екстракција.

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control е неиспитана контрола и нема назначени вредности. Контролата не претставува замена за комплетот контроли на производителот приложени кон анализата. EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control треба да се тестира според анализата на производителот или според упатствата и препораките на лабораторијата што го врши тестирањето. Очекуваните резултати за кои е користена EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control мора да ги утврди крајниот корисник за нивната конкретна анализа.

ЧУВАЊЕ И РАКУВАЊЕ:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control треба да се чува на температура од -20 °C или пониска.

Одмрзнете ја EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control на собна температура и пропресете ја пред употреба.

Откако ќе се одмрзне, EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control е стабилна 24 часа ако се чува на температура од 2-8 °C. Сите преостанати материјали мора да се фрлат по една употреба. Не смее повторно да се употребува. Не смее да се растворува.

Не употребувајте ја EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control по истекот на рокот на траење.

ОГРАНИЧУВАЊА:

За употреба при ин витро дијагностика.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА И МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control треба да се смета за опасна по живиот свет и околината. Треба да се практикуваат универзални мерки на претпазливост и соодветно фрланje¹. Не смее да се пипетира со уста. Не смее да се пуши, јаде или пие во областите каде што се ракува со примероците.

Фрлете го производот ако пакувањето е оштетено или ако протекува. Дезинфекцирајте ги течностите, материјалите или протекувањата со 0,5% раствор на натриум хипохлорит. Фрлете ги сите материјали и течности употребени во процедурата исто како да содржат патогени агенси.

РЕФЕРЕНЦИ:

- ¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec; 35 (10 Suppl 2): S65-164.
BIO-RAD и DROPLET DIGITAL PCR се трговски марки на Bio-Rad Laboratories, Inc. во одредени јурисдикции.

РЕФЕРЕНЦИ СИМБОЛИ:

Број на каталог



Број на серија



За ин витро дијагностичка употреба



Биолошки ризици



Рок на траење



Горна граница на температура



Производител



Внимание



Прочитајте ги упатствата за користење



Негативна контрола



Европска ознака за усогласеност



EC



REP

Овластен претставник



EC



REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
United States

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control sammendrag	
Katalognummer	COV000CE
Reaktiv analytt	Menneskelig genomisk DNA
Ikke-reakтив analytt	SARS-CoV-2
Matrise	Syntetisk matrise
Konservoingsmiddel	Natriumazid
Lagring	-20 °C eller lavere
Fyllvolum	0,3 ml
Antall glass per sett	5 glass
Antall bruk	Engangsbruk
Holdbarhet	12 måneder fra produksjonsdato
Forholdsregler	Biologiske risikoer
Forskriftsstatus	Til in vitro-diagnostisk bruk

TILTENKT BRUK:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control er en ekstern kvalitetskontroll, beregnet på å brukes med SARS-CoV-2-analyser for å overvåke resultatet til den gitte analysen. Kontrollen brukes til å overvåke fravær av SARS-CoV-2. Rutinemessig bruk av EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control gjør det mulig for laboratorier å evaluere den daglige og parti-til-parti-variasjonen i den molekylære analysen og teste operatørens dyktighet.

PRODUKTBESKRIVELSE:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control inneholder menneskelig genomisk DNA og er negativ for SARS-CoV-2. Kontrollen er beregnet på å teste hele prosessen med en molekylær analyse, inkludert ekstraksjon, forsterkning og deteksjon.

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control tilordnes intern verdi ved bruk av Bio-Rad digital dråpe-PCR (ddPCR). EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control er formulert i syntetisk matrise som inneholder konserveringsmidler.

PROSEODYRE:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control krever et ekstraksjonsstritt. Kontrollen må behandles på lignende måte som andre testede prøver. Dette gjør det mulig for operatøren å vurdere ekstraksjonsteknikken sin.

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control er en ikke-analysert kontroll og har ikke tilordnede verdier. Kontrollen skal ikke brukes som erstatning for produsentens settkontroller som følger med analysen. EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control skal testes i henhold til analyseprodusentens eller testlaboratoriets instruksjoner og anbefalinger. Forventede resultater ved bruk av EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control må etableres av sluttbrukeren for sin spesifikke analyse.

LAGRING OG HÅNDTERING:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control bør lagres ved -20 °C eller lavere.

Tin EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control ved romtemperatur og rist kort før bruk.

Når den er fint, er EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control stabil i 24 timer når den lagres ved 2–8 °C. Eventuelle gjenværende materialer må kastes etter én bruk. Må ikke brukes på nytt. Må ikke fortynnes.

Ikke bruk EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control utover utløpsdatoen.

BEGRENSNINGER:

Til in vitro-diagnostisk bruk.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control bør anses som biologisk farlig. Universelle forholdsregler og forsvarlig avhending bør praktiseres¹. Bruk ikke munnen til pipetting. Ikke røyk, spis eller drikk i områder der prøver håndteres.

Kast produktet hvis emballasjen er skadet eller lekker. Desinfiser væsker, materialer eller sør med en 0,5 % natriumhypokloritt-oppløsning. Kast alle materialer og væsker brukt i prosedyren som om de inneholdt sykdoms-fremkallende stoffer.

REFERANSER:

- ¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec; 35 (10 Suppl 2): S65-164.
BIO-RAD og DROPLET DIGITAL PCR er varemerker for Bio-Rad Laboratories, Inc. i visse jurisdiksjoner.

SYMBOLREFERANSER:

Katalognummer



Partinummer



Til in vitro-diagnostisk bruk



Biologiske risikoer



Utløpsdato



Øvre temperaturgrense



Produsent



Forsiktig



Se bruksanvisningen




Negative Control



Europeisk samsvarsmerke



Autorsert representant



Emergo Europe
Prinsessegacht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
United States

Zestawienie ujemnych prób kontrolnych EDX SARS-CoV-2	
Numer katalogowy	COV000CE
Analit reaktywny	Ludzki genomowy DNA
Analit niereaktywny	SARS-CoV-2
Macierz	Macierz syntetyczna
Konserwant	Azydek sodu
Przechowywanie	W temperaturze -20°C lub niższej
Objętość napełniania	0,3 ml
Liczba fiolek w zestawie	5 fiolek
Liczba zastosowań	Do jednorazowego użytku
Okres przydatności do użytku	12 miesięcy od daty produkcji
Środki ostrożności	Zagrożenie biologiczne
Stan prawny	Do diagnostyki in vitro

PRZEZNACZENIE:

Ujemne próbki kontrolne EDX SARS-CoV-2 to zewnętrzna kontrola jakości przeznaczona do stosowania z oznaczeniami SARS-CoV-2 w celu monitorowania wydajności danego oznaczenia. Próba stosowana jest do monitorowania zawartości SARS-CoV-2. Rutynowe przeprowadzanie ujemnych prób kontrolnych EDX SARS-CoV-2 umożliwia laboratoriom ocenę zmienności oznaczenia molekularnego między dniami i między seriami, a także sprawdzenie jakości pracy operatora.

OPIS PRODUKTU:

Ujemna próba kontrolna EDX SARS-CoV-2 zawiera ludzki genomowy DNA, ujemny dla SARS-CoV-2. Próba przeznaczona jest do testowania całego procesu oznaczenia molekularnego, w tym ekstrakcji, wzmacnienia i detekcji.

Ujemna próba kontrolna EDX SARS-CoV-2 ma wewnętrznie przypisaną wartość za pomocą technologii Bio-Rad Digital Droplet PCR (ddPCR). Ujemna próba kontrolna EDX SARS-CoV-2 jest przygotowywana w syntetycznej macierzy, która zawiera konserwanty.

PROCEDURA:

Ujemna próba kontrolna EDX SARS-CoV-2 wymaga przeprowadzenia etapu ekstrakcji. Próba musi być traktowana podobnie jak inne testowane próbki. Umożliwi to operatorowi ocenę techniki ekstrakcji.

Ujemna próba kontrolna EDX SARS-CoV-2 jest próbą nieoznaczoną i nie ma przypisanych wartości. Próba nie zastępuje kontroli zestawów producenta dostarczanych z oznaczeniem. Ujemna próba kontrolna EDX SARS-CoV-2 powinna być testowana zgodnie z instrukcjami i zaleceniami obowiązującymi w laboratorium wykonującym test lub wydanymi przez producenta oznaczenia. Użytkownik końcowy musi określić oczekiwane wyniki dla konkretnego oznaczenia z użyciem ujemnej próby kontrolnej EDX SARS-CoV-2.

PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE:

Ujemną próbę kontrolną EDX SARS-CoV-2 należy przechowywać w temperaturze -20°C lub niższej.

Ujemną próbę kontrolną EDX SARS-CoV-2 należy rozmrażać w temperaturze pokojowej i krótko wirować przed użyciem.

Po rozmrożeniu ujemna próba kontrolna EDX SARS-CoV-2 zachowuje stabilność przez 24 godziny w temperaturze 2–8°C. Pozostałe materiały należy wyrzucić po jednokrotnym użyciu. Nie używać ponownie. Nie rozcieńczać.

Nie używać ujemnej próby kontrolnej EDX SARS-CoV-2 po upływie daty ważności.

OGRANICZENIA:

Do diagnostyki in vitro.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Ujemną próbę kontrolną EDX SARS-CoV-2 należy traktować jako stwarzającą zagrożenie biologiczne. Należy stosować uniwersalne środki ostrożności i właściwe metody usuwania¹. Nie pipetować ustami. Obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania posiłków i napojów w miejscach, w których odbywa się praca z próbami.

W przypadku uszkodzenia lub nieszczelności opakowania produkt wyrzucić. Płyny i materiały, w tym rozlane, należy dezynfekować roztworem podchlorynu sodu w stężeniu 0,5%. Wszystkie materiały i płyny użyte w ramach procedury należy usuwać ze względu na zawartość czynników chorobotwórczych.

LITERATURA:

¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec; 35 (10 Suppl 2): S65-164.

BIO-RAD i DROPLET DIGITAL PCR są znakami towarowymi firmy Bio-Rad Laboratories, Inc. w systemach prawnych niektórych krajów.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

Numer katalogowy



Numer serii



Do diagnostyki in vitro



Zagrożenie biologiczne



Data ważności



Górny limit temperatury



Producent



Ostrzeżenie



Zapoznać się z instrukcją użycia



Negative Control



Europejski znak zgodności



Upoważniony przedstawiciel



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
United States

Producent: Exact Diagnostics LLC, 3400 Camp Bowie Blvd. CBH-214, Fort Worth, Texas 76107

W celu uzyskania pomocy i składania ponownych zamówień prosimy skontaktować się, wysyłając wiadomość e-mail na adres: customerservice@exactdiagnostics.com lub dzwoniąc pod numer **817.989.9262**

www.exactdiagnostics.com

PI0106-ROW Rev. 01.00

Resumo do EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control	
Número de catálogo	COV000CE
Analito reativo	ADN genómico humano
Analito não reativo	SARS-CoV-2
Matriz	Matriz sintética
Conservante	Azida de sódio
Armazenamento	-20 °C ou inferior
Volume de enchimento	0,3 ml
Número de frascos por kit	5 frascos
Número de utilizações	Utilização única
Validade	12 meses a partir da data de fabrico
Precauções	Riscos biológicos
Estatuto regulamentar	Para utilização em diagnóstico in vitro

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

O EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control é um controlo de qualidade externo, que se destina a ser utilizado com ensaios de SARS-CoV-2 para monitorizar o desempenho desse ensaio. O controlo é utilizado para monitorizar a ausência de SARS-CoV-2. A utilização rotineira de EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control permite aos laboratórios avaliar a variação de dia para dia e de lote para lote do seu ensaio molecular e testar a proficiência do operador.

Descrição do Produto:

O EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control contém ADN genómico humano e é negativo para SARS-CoV-2. O controlo tem como objetivo testar todo o processo de um ensaio molecular, incluindo a extração, amplificação e deteção.

É atribuído internamente um valor ao EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control utilizando o Bio-Rad Digital Droplet PCR (ddPCR). EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control é formulado em matriz sintética, que contém conservantes.

PROCEDIMENTO:

O EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control requer um passo de extração. O controlo deve ser tratado de uma forma semelhante às outras amostras testadas. Isto permite ao operador avaliar a sua técnica de extração.

O EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control é um controlo não analisado e não possui valores atribuídos. O controlo não é um substituto dos controlos de kit do fabricante fornecidos com o ensaio. O EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control deve ser testado de acordo com as instruções e recomendações do fabricante do ensaio ou do laboratório de testes. Os resultados esperados com o EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control devem ser estabelecidos pelo utilizador final para o seu ensaio específico.

ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO:

O EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control deve ser armazenado a uma temperatura de -20 °C ou inferior.

Descongele o EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control à temperatura ambiente e agite brevemente em vórtice antes de utilizar.

Depois de descongelado, o EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control permanece estável durante 24 horas quando armazenado a 2-8 °C. Quaisquer materiais restantes devem ser eliminados após uma utilização. Não reutilizar. Não diluir.

Não utilize o EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control após a data de validade.

LIMITAÇÕES:

Para utilização em diagnóstico in vitro.

AVISOS E PRECAUÇÕES:

O EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control deve ser considerado risco biológico. Devem ser adotadas precauções e medidas de eliminação adequadas universais¹. Não pipete com a boca. Não fume, não coma nem beba em áreas onde sejam manuseadas amostras.

Elimine o produto se a embalagem estiver danificada ou a pingar. Desinfete os líquidos, materiais ou derrames com uma solução de hipoclorito de sódio a 0,5%. Elimine todos os materiais e líquidos utilizados neste procedimento como se contivessem agentes patogénicos.

REFERÊNCIAS:

¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec, 35 (10 Suppl 2): S65-164.
BIO-RAD e DROPLET DIGITAL PCR são marcas comerciais da Bio-Rad Laboratories, Inc. em determinadas jurisdições.

REFERÊNCIAS DOS SÍMBOLOS:

Número de catálogo



Número do lote



Para utilização em diagnóstico in vitro



Riscos biológicos



Data de validade



Limite de temperatura máxima



Fabricante



Precaução



Consulte as Instruções de Utilização



Controlo negativo



Marca de conformidade europeia



Representante autorizado



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
United States

Rezumat EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control	
Număr de catalog	COV000CE
Analit reactiv	ADN genomic uman
Analit nereactiv	SARS-CoV-2
Matrice	Matrice sintetică
Conservant	Azidă de sodiu
Depozitare	la temperaturi de -20 °C sau mai scăzute
Volumul de umplere	0,3 ml
Numărul de fiole din fiecare kit	5 fiole
Numărul de utilizări	Unică folosință
Termen de valabilitate	12 luni de la data fabricației
Precauții	Riscuri biologice
Statut de reglementare	Pentru utilizare în diagnosticul in vitro

DOMENIUL DE UTILIZARE:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control este un ser de control pentru controlul extern al calității, destinat a fi utilizat cu testele SARS-CoV-2 în scopul monitorizării performanței testului efectuat. Serul de control este utilizat pentru a monitoriza absența SARS-CoV-2. Utilizarea sistematică a produsului EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control oferă laboratoarelor posibilitatea de a evalua variațiile de la o zi la alta și de la un lot la altul legate de testele de diagnostic molecular, precum și de a testa competența operatorului.

DESCRIEREA PRODUSULUI:

Produsul EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control conține ADN genomic uman și este negativ pentru SARS-CoV-2. Serul de control este destinat pentru testarea întregului proces al unui test de diagnostic molecular, inclusiv extractia, amplificarea și detecția.

Valoarea atribuită intern pentru produsul EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control a fost stabilită prin utilizarea Bio-Rad Digital Droplet PCR (ddPCR). Produsul EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control este preparat în matrice sintetică, ce conține conservanți.

PROCEDURA:

Produsul EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control impune efectuarea unei etape de extractie. Tratamentul aplicat serului de control trebuie să fie similar cu cel aplicat altor probe testate. Acest lucru îi permite operatorului să evaluateze tehnica de extractie a acestora.

Produsul EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control este un ser de control netestat și nu are valori atribuite. Serul de control nu este un înlocuitor al serurilor de control din kitul producătorului, furnizat împreună cu testul. Produsul EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control urmează să fie testat în conformitate cu instrucțiunile și cu recomandările producătorului testului sau ale laboratorului de testare. Rezultatele preconizate prin utilizarea produsului EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control trebuie stabilite de utilizatorul final pentru testul său specific.

DEPOZITARE ȘI MANEVRARE:

Produsul EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control trebuie depozitat la -20 °C sau la temperaturi mai scăzute.

Lăsați produsul EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control să se decongeleze la temperatura camerei și agitați pentru scurt timp înainte de utilizare.

Odată decongelat, produsul EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control este stabil timp de 24 de ore dacă este depozitat la temperaturi cuprinse între 2 - 8 °C. Toate materialele rămase trebuie eliminate după o singură utilizare. A nu se reutiliza. A nu se dilua.

Nu utilizați produsul EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control după data expirării acestuia.

LIMITĂRI:

Pentru utilizare în diagnosticul in vitro.

AVERTISMENTE ȘI MĂSURI DE PRECAUȚIE:

Produsul EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control trebuie considerat un produs cu risc biologic. Trebuie puse în practică măsurile universale de precauție și de eliminare corespunzătoare la deșeură¹. Nu pipetați folosind gura. Nu fumați, nu consumați alimente și băuturi în zonele zonele în care se manevrează probele.

Aruncați produsul dacă ambalajul este deteriorat sau prezintă surgeri. Dezinfecția lichidele, materialele sau surgerile cu o soluție de hipoclorit de sodiu 0,5 %. Eliminați toate materialele și lichidele utilizate în procedură ca și cum ar conține agenți patogeni.

REFERINȚE:

- ¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec, 35 (10 Suppl 2): S65-164.
BIO-RAD și DROPLET DIGITAL PCR sunt mărci comerciale ale Bio-Rad Laboratories, Inc. în anumite jurisdicții.

REFERINȚE SIMBOLURI:



Număr de catalog



Număr lot



Pentru utilizare în diagnosticul in vitro



Riscuri biologice



Data expirării



Limită superioară de temperatură



Producător



Atenție



Consultați instrucțiunile de utilizare



Negative Control



Marca europeană de conformitate



Reprezentant autorizat



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
United States

Zhrnutie výrobku EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control	
Katalógové číslo	COV000CE
Reaktívny analyt	Ľudská genómová DNA
Nereaktívny analyt	SARS-CoV-2
Matrica	Syntetická matrica
Konzervačné činidlo	Azid sodný
Uskladnenie	-20 °C alebo menej
Objem náplne	0,3 ml
Počet liekoviek v súprave	5 liekoviek
Počet použití	Jednorazové použitie
Použiteľnosť	12 mesiacov od dátumu výroby
Preventívne opatrenia	Biologické riziká
Regulačný štatút	Určené na diagnostiku in vitro

URČENÉ POUŽITIE:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control predstavuje externú kontrolnú skúšku kvality určenú na použitie s testmi SARS-CoV-2 na sledovanie vykonania daného testu. Kontrolná skúška sa používa na monitorovanie neprítomnosti SARS-CoV-2. Bežné použitie výrobku EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control umožňuje laboratóriám vyhodnotiť každodennú variáciu molekulárneho testu a jeho variáciu v jednotlivých dávkach a preskúsať odbornú spôsobilosť obsluhujúceho pracovníka.

POPIS VÝROBKU:

Výrobok EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control obsahuje ľudskú genómovú DNA a je negatívny na SARS-CoV-2. Táto kontrolná skúška je určená na preskúšanie celého procesu molekulárneho testu vrátane extrakcie, amplifikácie a detekcie.

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control je interne priradená hodnota použitím Bio-Rad Digital Droplet PCR (ddPCR). EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control sa pripravuje v syntetickej matrici, ktorá obsahuje konzervačné činidlá.

POSTUP:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control si vyžaduje krok extrakcie. K tejto kontrolnej skúške je potrebné pristupovať podobným spôsobom, ako k ostatným testovaným vzorkám. Vďaka tomu môže obsluhujúci pracovník vyhodnotiť techniku ich extrakcie.

Výrobok EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control predstavuje netestovanú kontrolnú skúšku bez priradených hodnôt. Táto kontrolná skúška nie je náhrada kontrolných skúšok v súbore výrobcu dodávaných s testom. Výrobok EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control sa musí testovať v súlade s pokynmi alebo odporúčaniami výrobcu testu alebo testovacieho laboratória. Koncový používateľ musí pre konkrétny test stanoviť očakávané výsledky pomocou výrobku EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control.

USKLADNENIE A MANIPULÁCIA:

Výrobok EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control skladujte pri teplote -20 °C alebo nižšej.

Roztopte EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control pri izbovej teplote a pred použitím ho krátko pretrepte.

Po roztopení je EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control stabilný 24 hodín, keď sa skladuje pri teplote 2 – 8 °C. Akýkoľvek zvyšný materiál je potrebné po jednom použití zlikvidovať. Nepoužívajte opakovane. Nerieďte.

Výrobok EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control nepoužívajte po dátume exspirácie.

OBMEDZENIA:

Určené na diagnostiku in vitro.

UPOZORNENIA A OPATRENIA:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control sa musí považovať za biologicky nebezpečný. Uplatňujte všeobecné opatrenia a zabezpečte riadnu likvidáciu¹. Nepipetujte ústami. Na miestach manipulácie so vzorkami nefajčite, nejedzte ani nepite.

V prípade poškodenia alebo presakovania balenia výrobok zlikvidujte. Tekutiny, materiály alebo rozliaty výrobok dezinfikujte pomocou 0,5 % roztoku chlórsnanu sodného. Všetky materiály a tekutiny používané v uvedenom postupe likvidujte, akoby obsahovali patogénnych pôvodcov.

LITERATÚRA:

- ¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec, 35 (10 Suppl 2): S65-164.
BIO-RAD a DROPLET DIGITAL PCR sú v určitých jurisdikciách ochrannými známkami spoločnosti Bio-Rad Laboratories, Inc.

REFERENČNÉ SYMBOLY:

Katalógové číslo



Číslo šarže



Určené na diagnostiku in vitro



Biologické riziká



Dátum exspirácie



Maximálna teplota



Výrobca



Pozor



Pozrite návod na použitie



Negatívna kontrolná skúška



Európske označenie zhody



Autorizovaný zástupca



Emergo Europe
Prinsessegacht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
United States

Výrobca: Exact Diagnostics LLC, 3400 Camp Bowie Blvd. CBH-214, Fort Worth, Texas 76107

Ak potrebujete pomoc alebo doplniť objednávku, kontaktujte adresu customerservice@exactdiagnostics.com alebo

telefónne číslo **817 989 9262**

www.exactdiagnostics.com

PI0106-ROW Rev. 01.00

Resumen de EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control	
Número de catálogo	COV000CE
Analito reactivo	ADN genómico humano
Analito no reactivo	SARS-CoV-2
Matriz	Matriz sintética
Conservante	Azida sódica
Almacenamiento	-20°C o menos
Volumen de llenado	0,3 ml
Número de viales por kit	5 viales
Número de usos	Un solo uso
Vida útil	12 meses desde la fecha de fabricación
Precauciones	Riesgos biológicos
Estado normativo	Para uso en diagnóstico in vitro

USO PREVISTO:

El EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control es un control de calidad externo, destinado al uso con ensayos de SARS-CoV-2 para supervisar el rendimiento de un ensayo dado. El control se utiliza para monitorizar la ausencia de SARS-CoV-2. El uso rutinario de EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control permite a los laboratorios evaluar la variación día a día y lote a lote de su ensayo molecular y probar la eficiencia del operador.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control contiene ADN genómico humano y es negativo para SARS-CoV-2. El control está indicado para probar todo el proceso de un ensayo molecular incluyendo la extracción, amplificación y detección.

Internamente se asigna un valor al EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control utilizando Bio-Rad Digital Droplet PCR (ddPCR). El EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control se formula en matriz de LCR sintética, que contiene conservantes.

PROCEDIMIENTO:

El EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control requiere un paso de extracción. El control se debe tratar de forma similar a otras muestras probadas. Esto permite al operador evaluar su técnica de extracción.

El EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control es un control no ensayado y no tiene valores asignados. El control no se debe utilizar como sustituto de los controles del kit del fabricante proporcionados con el ensayo. El EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control se debe probar de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones del fabricante del ensayo o del laboratorio que realiza las pruebas. El usuario final será el encargado de establecer los resultados previstos con el EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control para su ensayo específico.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:

El EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control debe almacenarse a -20°C o menos.

Descongele el EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control a temperatura ambiente y agite en vórtex brevemente antes del uso.

Una vez descongelado, el EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control es estable durante 24 horas si se almacena a 2-8 °C. Debe desecharse cualquier material restante después de un solo uso. No lo reutilice. No lo diluya.

No utilice el EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control más allá de la fecha de caducidad.

LIMITACIONES:

Para uso en diagnóstico in vitro.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

El EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control debe considerarse de riesgo biológico. Se deben emplear las precauciones universales y de desechado adecuadas¹. No pipetee con la boca. No fume, coma ni beba o en las zonas en las que se manipulan los especímenes.

Deseche el producto si el envase está dañado o presenta fugas. Desinfecte líquidos, materiales o derrames con una solución de hipoclorito de sodio al 0,5 %. Deseche todos los materiales y líquidos utilizados en el procedimiento como si contuvieran agentes patógenos.

REFERENCIAS:

¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec, 35 (10 Suppl 2): S65-164.

BIO-RAD y DROPLET DIGITAL PCR son marcas comerciales de Bio-Rad Laboratories, Inc. en algunas jurisdicciones.

REFERENCIAS DE LOS SÍMBOLOS:

Número de catálogo



Número de lote



Para uso en diagnóstico in vitro



Riesgos biológicos



Fecha de caducidad



Límite superior de temperatura



Fabricante



Advertencia



Consulte las instrucciones de uso



Control negativo



Marca europea de conformidad



EC



REP

Representante autorizado



EC



REP

Emereo Europe
Prinsessegacht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
United States

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control Sammanfattning	
Artikelnummer	COV000CE
Reaktiv analyt	Humangenom-DNA
Icke-reakтив analyt	SARS-CoV-2
Matris	Syntetisk matris
Konserveringsmedel	Natriumazid
Lagring	-20 °C eller lägre
Fyllningsvolym	0,3 mL
Antal flaskor per uppsättning	5 flaskor
Antal användningar	För engångsbruk
Hållbarhet	12 månader efter tillverkningsdatum
Försiktighetsåtgärder	Biologiska risker
Gällande status	För in vitro-diagnostiskt bruk

AVSEDD ANVÄNDNING:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control är en extern kvalitetskontroll, avsedd att användas vid SARS-CoV-2-analyser för att övervaka prestanda för den givna analysen. Kontrollen används för att övervaka frånvaro av SARS-CoV-2. Rutinmässig användning av EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control gör det möjligt för laboratorier att utvärdera den dagliga variationen och variationen från en batch till en annan i sin molekylära analys samt testa operatörskompetensen.

PRODUKTBESKRIVNING:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control innehåller humangenom-DNA och är negativt för SARS-CoV-2. Kontrollen är avsedd att testa hela processen för en molekylanalys inklusive extraktion, amplifiering och detektion.

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control tilldelas värde internt med hjälp av Bio-Rad Digital Droplet PCR (ddPCR). EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control är formulerad i syntetisk matris som innehåller konserveringsmedel.

PROCEDUR:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control kräver ett extraktionssteg. Kontrollen måste behandlas på liknande sätt som andra testade prover. Detta gör det möjligt för operatören att utvärdera sin extraktionsteknik.

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control är en oprövd kontroll och har inga tilldelade värden. Kontrollen ersätter inte tillverkarens uppsättningskontroller som medföljer analysen. EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control ska testas i enlighet med analystillverkarens eller testlaboratoriets anvisningar och rekommendationer. Förväntade resultat med EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control måste fastställas av slutanvändaren för sin specifika analys.

FÖRVARING OCH HANTERING:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control bör förvaras vid -20 °C eller lägre.

Tina EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control i rumstemperatur och rör snabbt om före användning.

När den väl är upptinad är EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control stabil i 24 timmar när den lagras vid 2-8 °C. Allt återstående material måste kasseras efter en användning. Får ej återanvändas. Får ej spädas ut.

Använd inte EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control efter angivet utgångsdatum.

BEGRÄNSNINGAR:

För in vitro-diagnostiskt bruk.

WARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

EDX SARS-CoV-2 Negative Run Control bör betraktas som biologiskt riskmaterial. Universella försiktighetsåtgärder och korrekt avfallshantering bör tillämpas¹. Munpipettera ej. Rök, ät och drick inte i områden där testprov hanteras.

Kassera produkt om förpackningen är skadad eller läcker. Desinficera vätskor, material eller spill med 0,5 % natriumhypokloritlösning. Kassera alla material och vätskor som används i proceduren som om de innehöll patogena medel.

REFERENSER:

- ¹ Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. *Am J Infect Control* 2007 Dec; 35 (10 Suppl 2): S65-164.
BIO-RAD och DROPLET DIGITAL PCR är varumärken från Bio-Rad Laboratories, Inc. i vissa rättskipningsområden.

SYMBOLREFERENSER:

Artikelnummer



Batchnummer



För in vitro-diagnostiskt bruk



Biologiska risker



Utgångsdatum



Övre temperaturgräns



Tillverkare



Varning



Se bruksanvisningen



Negativ kontroll



CE-märkt



Auktoriserad representant



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Exact Diagnostics LLC
3400 Camp Bowie Blvd CBH-214
Fort Worth Texas 76107
United States

Tillverkad av: Exact Diagnostics LLC, 3400 Camp Bowie Blvd. CBH-214, Fort Worth, Texas 76107
För hjälp eller återbeställning, kontakta customerservice@exactdiagnostics.com eller **817.989.9262**

www.exactdiagnostics.com

PI0106-ROW Rev. 01.00